©2018 https://pharmatop1.com ALL RIGHTS RESERVED

أموكسيسللين ٥٠٠ مجم + فلوكلوكساسيللين ٥٠٠ مجم

مضاد حيوى واسع المدى

التركيب :

كل قرص محزز يحتوى على أموكسيسللين تراى هيدرات وفلوكلوكساسيللين صوديوم مونوهيدرات

يعادل أموكسيسللين ٥٠٠ مجم.

فلوكلوكساسيللين ٥٠٠ مجم.

الخواص الفارماكولوجية :

يتكون **فلوكسامو**® من نوعين من المضادات الحيوية ينتميان إلى مجموعة البنسيللين.

يعتبر أموكسيسللين مضاد حيوى واسع المدى يمتص جيداً بعد تناوله بالفم ويظهر فى الدم بصورة عالية أكثر من ٩٠٪ وحوالى ٦٠٪ منها يظهر فى البول بدون تغيير .

يعتبر فلوكلوكساسيللين مضاد حيوى مقاوم للأنزيمات التى تفرزها بعض البكتيريا وهو يمتص بالفم ويظهر بالدم بنسبة كبيرة تصل إلى ٨٠ ٪ ويظهر منها ٦٠٪فى البول بدون تغيير .

يتركز كل من المضادين الحيويين فى أنسجة الجسم المختلفة مثل أنسجة الرئة والجلد والنخاع وكذلك الأذن والأنف واللوزتين .

التأثير المضاد للبكتيريا :

يعتبر أموكسيسللين مضاد حيوى واسع المدى للبكتيريا الموجبة والسالبة الجرام وقد أضيف فلوكلوكساسيللين حتى يحمى من بعض البكتيريا التى تفرز إنزيمات " البيتالاكتيميز " التى قد تفقد فاعلية المضادات الحيوية من مشتقات البنسيللين .

لذلك يعتبر **فلوكسامو**® مضاد حيوى قوى يتميز بفاعليته ضد العديد من البكتيريا والتى قد تفرز أنزيمات مختلفة مما يجعله واسع المدى لأنواع البكتيريا المختلفة.

دواعى الإستخدام :

العدوى البكتيرية التى تصيب الأجزاء التالية:

- الجلد والأنسجة الدقيقة مثل الخراريج والجروح والدمامل والتهابات الثدى وما بعد العمليات وغيرها.
- العظام والمفاصل .
- الجهاز التنفسى العلوى والسفلى مثل إلتهاب اللوزتين والجيوب الأنفية والأذن الوسطى والخارجية وكذلك الإلتهاب الرئوى.

طريقة الإستعمال :

الجرعة للبالغين

قرص واحد كل ٨ ساعات

(يمكن أن يعطى كل ٦ ساعات فى الحالات الأكثر خطورة)

الجرعة للأطفال من سن ٨-١٦ سنة

نصف قرص كل ٨ ساعات

(يمكن أن يعطى كل ٦ ساعات فى الحالات الأكثر خطورة)

الإستخدام أثناء الحمل أو الإرضاع:

يمكن إستخدام **فلوكسامو**® أثناء فترة الحمل أو الإرضاع عندما يكون هناك حاجة ماسة لإستخدامه وتحت إشراف الطبيب المعالج .

الإحتياطات:

يستخدم **فلوكسامو**® بحرص فى المرضى كبار السن وكذلك الذين لديهم قصور فى وظائف الكلى والكبد .

موانع الإستخدام :

لا يستخدم **فلوكسامو**® مع المرضى الذين لديهم حساسية من مشتقات البنسيللين أو السيفالوسبورين .

تحذيرات :

تناول أموكسيسللين مع مضادات التخثر التى تعطى عن طريق الفم قد يتسبب فى زيادة زمن النزيف وقد يحتاج المريض لإعادة ضبط جرعة مضادات التخثر (التى تعطى عن طريق الفم)

الأعراض الجانبية :

يعتبر **فلوكسامو**® مضاد حيوى أمن الأستعمال ولكن فى حالات قليلة ونادرة قد يحدث غثيان أو إسهال أو قيىء أو يرقان الصفراء التى تختفى مع توقف العلاج .

العبوة :

شريط يحتوى على ٨ أقراص محززة فى عبوة من شريطين .

تحفظ جميع الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال

إنتاج
شركة أمون للأدوية ش.م.م
مدينة العبور: القاهرة : مصر.
P03903
V04 19 2 13

Original content at : https://www.pharmatop1.com/floxamo-ar/