©2018 https://pharmatop1.com ALL RIGHTS RESERVED

يوصف فلوكسامو في العادة في الإلتهابات البكتيرية التي تلى الجراحات و الإلتهابات الرئوية بعد العمليات ، كذلك يوصف في علاج التهابات الجهاز التنفسى مثل التهابات القصبات الهوائية ، التفاقم الحاد لالتهاب الشعب الهوائية المزمن.يمكن أيضا أن يوصف فلوكسامو في حالات حمى النفاس و إنتان الدم ، عدوى العظام ،الأسنان و التهابات الأذن والأنف والحنجرة.

الجرعة المقترحة

الجرعة المقترحة للبالغين و المسنين قرص واحد (1 جرام) كل 6 ساعات ، و يمكن زيادة الجرعة الى قرصين كل 6 ساعات حسب شدة الحالة .
في حالة اعتلال وظائف الكلى ، يجب تعديل الجرعة حسب شدة الاختلال في وظائف الكلى .
في حالات الاعتلال الكبدي ، يجب تقليل تكرار الجرعة تبعا لشدة الحالة.
يجب أن تؤخذ جرعة فلوكسامو من 0.5 إلى 1 ساعة قبل وجبات الطعام.

موانع الإستعمال

لا يجب إعطاء فلوكسامو إلى المرضى الذين لديهم تاريخ من الحساسية مع المضادات الحيوية من فئة بيتا لاكتام (مثل البنسلين ، والسيفالوسبورين) .

تحذيرات و احتياطات

الكثير من المضادات الحيوية، بما في ذلك فلوكسامو ، و خصوصاً مع الإستعمال المطول ، قد يؤدى الى فرط نمو نوع خطير من البكتيريا في الأمعاء الغليظة. الأمر الذى قد يتسبب فى أعراض مثل الإسهال الخفيف (c.difficle associate diarrhea) وقد يتطور الوضع الى حالة خطيرة مهددة للحياة تسمى (التهاب الأمعاء الغليظة).

من أعراض هذه الحالة (التهاب الامعاء الغليظة) ما يلى : براز مائي أو دموي، إسهال، تقلصات في المعدة، الحمى او ارتفاع فى درجة الحرارة , و فى حال حدوث ذلك يجب عدم تناول الأدوية المسكنة للمغص او الادوية المضادة للاسهال , و لكن يجب طلب العناية الطبية من طبيب مختص .
استعمال فلوكسامو لفترة زمنية طويلة يزيد من إمكانية التسبب في هذا النوع من العدوى (التهاب الامعاء الغليظة difficile associated diarrhea)أو COLITIS , لذلك يجب أن يتم استخدام فلوكسامو فقط لعلاج الالتهابات البكتيرية بناء على وصفة الطبيب ، كما يجب الإلتزام بالجرعات و المدة العلاجية التي حددها لك طبيبك .
جدير بالذكر ان حالة التهاب القولون يمكن ان تحدث خلال فترة العلاج بـ فلوكسامو أو بعد عدة اشهر من التوقف عن تناولة .

إرشادات عامة

فلوكسامو فى العادة ما يؤخذ ثلاث إلى أربع مرات في اليوم.
طول و مدة العلاج تعتمد على نوع العدوى. بشكل عام المضادات الحيوية تعمل بشكل أفضل عندما يتم الاحتفاظ بكمية الدواء في الجسم عند مستوى ثابت. ولذلك،فمن المنصوح بة تناول جرعتك فى نفس التوقيت من اليوم طوال فترة الاستخدام .
من الضرورى مواصلة استخدام فلوكسامو حتى يتم الانتهاء من كامل الجرعة , و المدة التى حددها الطبيب حتى لو اختفت الأعراض بعد بضعة أيام. لأن وقف الدواء في وقت مبكر قد يسمح للبكتيريا ان تستمر في النمو، مما قد يؤدي الى انتكاسة للحالة .
فى العادة ما يبدأ المريض بالتحسن خلال الأيام القليلة الأولى من العلاج بهذا الدواء .

Original content at : https://www.pharmatop1.com/floxamo-ar/

©2018 https://pharmatop1.com ALL RIGHTS RESERVED

الآثار الجانبية

تذكر أن طبيبك قام بوصف هذا الدواء لك بعد ان تأكد ان الفوائد التي تترتب على استخدامه تفوق الاعراض الجانبية التى يمكن ان تنتج من استخدامها . كما يجب التأكيد على أن الأعراض الجانبية لأي دواء , هى حالات محتملة الحدوث , و ليست مؤكدة الحدوث ....و الناس تختلف فى ردود فعلها تجاه الدواء .فقد يتناول المريض الدواء و لا يشعر بأى اعراض جانبية او قد يتناول آخر الدواء و يختبر عرض واحد ..فى حين قد يتناول مريض آخر نفس الدواء و يختبر عرض جانبى مختلف .و تذكر أيضا أن معظم الاعراض الجانبية للادوية تكون فى ادنى مستوياتها طالما تم الالتزام بالجرعات الموصى و المنصوح بها .

الكثير من الاعراض الجانبية للادوية يمكن للجسم ان يتأقلم عليها و يتعامل معها مع الاستمرار فى تناول الدواء ...بمعنى انة فى بداية الاستعمال تظهر الاعراض الجانبية بشدة ثم تبدأ في التناقص او الاختفاء مع الاستمرار فى تناول الدواء نتيجة تأقلم الجسم .

فلوكسامو قد يتسبب في الآثار الجانبية التالية , و هى اعراض محتملة و يمكن للجسم ان يتأقلم عليها , و لكن يجب اخبار الطبيب المعالج فى حال استمرار هذة الاعراض لفترات طويلة او فى حال ما اذا كانت هذة الاعراض متزايدة او شديدة فى حدتها : غثيان ، قيء، حرقة في المعدة، بقع بيضاء في الفم، افرازات مهبلية بيضاء سميكة، الشعور بالحرقان والحكة و التورم في المهبل.

بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. فإذا كنت تواجه أي من الأعراض التالية ، فيجب ايقاف تناول فلوكسامو و التوجة للحصول على العلاج الطبي في حالات الطوارئ : بثور وطفح جلدى، صعوبة في التنفس أو البلع، اصفرار الجلد أو العينين، انخفاض كمية البول .

الحمل و الرضاعة

تركيبة دواء فلوكسامو تم تصنيفها بواسطة هيئة الغذاء والدواء الامريكية على انة من الفئة B , بمعنى ان الدراسات التى تمت على الحيوانات لم تسفر عن ادلة لوجود ضرر على الاجنة , و لكنة لم تجرى دراسات على الأنسان , و بالتالى فانه من الممكن تناول هذا الدواء خلال فترة الحمل فقط فى الحالات الضرورية و تحت اشراف طبى مختص .

لا ينصح بتناول المرضعات فلوكسامو ,و يفضل اللجوء الى بدائل اخرى خلال فترة الرضاعة , و فى الحالات الضرورية التي تستدعي تناولة (و لا يوجد بدائل ممكنة) فقد يقرر الطبيب المختص أيقاف الرضاعة الطبيعية او مراقبة الرضيع عن كثب لمتابعة تطور ظهور أعراض جانبية على الرضيع من عدمه .

Original content at : https://www.pharmatop1.com/floxamo-ar/