

فلاكسوبرايد

موسابرايد سيرتيت 5 مجم

اقراص سريعة الذوبان في الفم

الاسم العلمي :

موسابرايد سيرتات 5 مجم

التركيب :

كل قرص سريع الذوبان في الفم يحتوي علي

موسابرايد سيرتات 5 مجم

مواد غير فعالة

ماليبول . كلوريد الصوديوم . لاکتوز . نشا . حمض سيرتريك لامائي

كرومكلورميلوز . بوهيدون . اسبارتام . توفيفروني . ايروسيل 200 . ماغنيسيوم ستيريت

النسكل الصيدلي :

قرص سريعة الذوبان في الفم

التأثير الدوائي :

يحقق هذا الدواء مستقيلات السيرتونين في القناة الهضمية ويزيد من اقراز الاسيتيل كولين من اجل

تحسين وظائف حركية الامعاء وتفرغ المعدة

فلاكسوبرايد هو محفز متخصص لمستقيلات السيرتونين النوع الرابع دون قابلية لمستقيلات السيرتونين

رقم 1 . 2

يحسن الموسابرايد من حركة المرئ ويقيد من مرض ارتجاع المرئ

يزيد فلاكسوبرايد من حركة الطعام عبر المرئ اثناء البلع

يقفل فلاكسوبرايد من الوقت اللازم لتفرغ المعدة

يقفل فلاكسوبرايد ارتجاع حمض المعدة (تقاس بمناخعة الاس الهيدروجيني للمعدة)

الحركة الدوائية :

بعد تناول جرعة واحدة عبر الفم من فلاكسوبرايد (40-5 مجم) . تصل مستويات فلاكسوبرايد لذروتها

بعد حوالي ساعة متوسط الزمن اللازم لخروج نصف كمية الدواء من الجسم هي 1.4 ساعة الي ساعتين

بعد تناول جرعة واحدة من فلاكسوبرايد (40 مجم) . يصبح اعلي تركيز لناخ الايض الاول (52 نانوجرام /مل)

بعد 0.5 ساعة والوقت اللازم لخروج نصف الكمية هو 4.3 ساعات

يتخلص الجسم من فلاكسوبرايد عن طريق البول والبراز بعد 48 ساعة من تناول 5 مجم من فلاكسوبرايد

دواتي الاستخدام :

يستخدم هذا الدواء لعلاج حرقان المعدة . الغثيان والقئ الناخ عن التهاب المعدة المزمن

كعلاج مساعد لحلول غسل المعدة عبر الفم لفحص اشعة اكس باستخدام حقنه الباريوم الشرجية

الجرعة والاستخدام :

الجرعة بصفة عامة : للبالغين قرص واحد (5 مجم) في الفم 3 مرات يومياً قبل الوجبات

الجرعة المفقودة : يجب تناول الجرعة المفقودة في اقرب وقت يمكن وانا حان موعد الجرعة التالية . يجب ان تتخطى

الجرعة المفقودة وتكمل الجرعة بشكل منتظم

الجرعة الزائدة : يجب الرجوع للطبيب اذا تناولت جرعة زائدة عن جرعتك

حالات اخري : لايجب ايقاف الدواء دون الرجوع للطبيب

موانع الاستخدام :

اذا كان لديك حساسية للموسابرايد او اي من مكونات الدواء

اذا كنت مريضاً بالزرف او بانسداد هضمي

اذا كنت تعاني من مشاكل وراثية في عدم التوافق مع بعض السكريات لاتتناول هذا الدواء حيث انه يحتوي على اللاكتوز

الآثار الجانبية :

لم تسجل اي اثار جانبية خطيرة بعد . ماعدا في 2.71 % فقط من المرضى الذين تناولوا فلاكسوبرايد لمدة تزيد عن

اسبوعين

قد تظهر بعض الآثار الجانبية كألم بالمعدة . اسهال او لين في البراز . جفاف بالفم . طفح . رعشة . غثيان . الشعور

بالامتلاء .

الاحساس بالارهاق وفقدان الشهية .

ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية في 1% في بعض المرضى وارتفاع نسبة انزعات ناقلات الاسبرينات و الألانين

والترانسامينات في 1.4 % (أجمالي 1.4 % من المرضى)

نابراً ما قد تحدث زيادة في ضربات يطين القلب في المرضى ذوي الانخفاض في معدل اليوناتسيوم في الدم

في حالات نادرة جداً قد تحدث بعض الآثار الجانبية مثل اصفرار الجلد والملتحمة . التهاب الكبد المداهم

التفاعلات الدوائية :

الاستخدام المتزامن للدواء ومضادات الاسيتيل كولين (الاتروبين . بيوتيل سكوبولامين بروميد) يقلل من فاعلية

فلاكسوبرايد لذلك يجب تناولهم بفارق من الوقت

الاستخدام المتزامن مع الادوية التي يتم ابيضها بالسيتوكروم P450 (مثل كيتوكونازول . ايتراكونازول . مضادات

حيوية فئة الماكروليدات

ومثبطات بروتيز HIV) قد يزيد من تركيز فلاكسوبرايد في البلازما

الحمل والرضاعة :

لا يستخدم اثناء فترتي الحمل والرضاعة

التخزين :

يحفظ بعيداً عن الحرارة والرطوبة واشعة الشمس المباشرة

يحفظ بعيداً عن متناول الاطفال

يجب عدم الاحتفاظ بما يتبقى من الدواء

يحفظ في درجة حرارة الغرفة (20-25 ° مئوية)

يحفظ من التجميد

العوية

عوة كرتون تحتوي علي 1 . 2 . 3 . او 4 شرائط كل شريط يحتوي علي 10 اقراص ونشرة داخلية

معلومات للمريض :

لا يجب استخدام الدواء دون الرجوع للطبيب